



# Covid-19 : Prise en charge d'un patient asymptomatique

Version au 2 septembre 2020

NB. Cas confirmé asymptomatique (par exemple RT-PCR + chez un cas contact asymptomatique) → Prise en charge identique aux cas symptomatiques

## Cas contact au domicile

= Dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique):  
Personne qui a partagé le même lieu de vie qu'un cas confirmé ou probable.

Identifié par le médecin ayant pris en charge le cas confirmé ou probable (recueil d'informations sur [AmeliPro](#))

- Prescription de RT-PCR à réaliser immédiatement

- Arrêt de travail si télétravail impossible.

- Quatorzaine stricte au domicile ou en centre d'hébergement

Discuter centre d'hébergement si risques de transmission non maîtrisables, présence de personnes vulnérables ou travailleur dont l'activité est essentielle  
Maintenue jusqu'au 14<sup>ème</sup> jour après guérison clinique de tous les cas du domicile (si vie séparée au sein du domicile: au 14<sup>ème</sup> jour après dernier contact avec le cas)

Si 1<sup>ère</sup> RT-PCR négative: maintien de la quatorzaine.

Si 2<sup>ème</sup> RT-PCR à J7 négative: allégement possible (= sorties autorisées limitées, avec port obligatoire de masque chirurgical, pas de contact avec personne à risque de forme grave, pas de travail présentiel)

Port du masque, lavage régulier des mains, surveillance température 2x/jour, surveillance des signes respiratoires

- Si apparition de symptômes : prise en charge comme un patient symptomatique



## Cas contacts hors domicile

= Dans les 48 h avant le début des symptômes (dans les 7 jours avant le diagnostic si le malade est asymptomatique):

. Personne qui a eu un contact direct avec un cas confirmé ou probable, en face à face, à moins d'1 mètre du cas quelle que soit la durée, lors d'une discussion, d'un repas, d'une accolade, d'un flirt (hors croisement fugace dans l'espace public) ;

. Personne qui a reçu ou prodigué des actes d'hygiène ou de soins ;

. Personne qui a partagé un espace confiné (bureau, véhicule) pendant au moins 15 minutes ou lors d'une toux ;

. Elève ou enseignant de même classe scolaire ou groupe de TD universitaire.



Identifié par les services de l'Assurance maladie (+/- s'il le souhaite par le médecin ayant pris en charge le cas confirmé ou probable)

- RT-PCR (prescrit par Assurance maladie): 7 jours après le dernier contact avec le malade

- Arrêt de travail si télétravail impossible (prescrit par Assurance maladie)

- Possibilité de se procurer des masques chirurgicaux en pharmacie d'officine

- Quatorzaine stricte au domicile ou en centre d'hébergement

Modalités identiques à celle des cas contacts au domicile

## Personnes à risque de Covid-19 grave



A compter du 1<sup>er</sup> septembre 2020, hors Guyane et Mayotte, le dispositif de chômage partiel ne concerne que les facteurs de risque suivants :

- Cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) - Âge ≥ 65 ans ET diabète ET obésité ou complications micro ou macrovasculaires

- Immunodépression - Dialyse ou insuffisance rénale chronique sévère

Si la personne ne souhaite pas reprendre le travail, et lorsque le télétravail est impossible: chômage partiel (si salarié) ou arrêt de travail (si non salarié).

Modalités:

> Si la personne est salariée du privé, son médecin traitant ou à défaut un médecin de ville lui délivre un certificat sur le modèle suivant (sans date de terme): « Par la présente, je certifie que M/Mme X doit, compte-tenu des recommandations sanitaires, respecter une consigne d'isolement le conduisant à ne plus pouvoir se rendre sur son lieu de travail ». Cette procédure peut être réalisée par voie de téléconsultation auquel cas le médecin adresse le certificat à l'assuré (par mail ou courrier) afin que celui-ci puisse le communiquer à son employeur.

> Pour les autres catégories : arrêt de travail de préférence en ligne sur AmeliPro.

## Proches de personnes à risque de Covid-19 grave



A compter du 1<sup>er</sup> septembre 2020, les personnes qui partagent leur domicile avec un proche à l'état de santé jugé fragile peuvent bénéficier des mêmes dispositions que les personnes à risque de Covid-19 grave uniquement en Guyane et Mayotte.

Modalités:

Identiques à celles des personnes à risque de Covid-19 grave.

## Garde d'enfants de moins de 16 ans



En cas de fermeture d'école et lorsque le télétravail est impossible: congés ou RTT.

Modalités : Le médecin généraliste n'intervient pas.

## Autres profils

= Pathologie chronique n'entrant pas dans les facteurs de risque officiels de forme grave (en ALD ou non), 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestres de grossesse, anxiété, etc.



Evaluer le risque lié à la pathologie, le cumul éventuel de facteurs de risques et l'exposition professionnelle

Avis médecine du travail si réticence patient ou doute sur risque

Indications et modalités d'arrêt de travail par le médecin généraliste : comme dans la pratique habituelle.